


Dr. João Alves Cardoso Júnior

CRM 54.134 | RQE 49.660

Titulado pela Academia Brasileira de Neurologia
Distúrbios do Movimento • Cognição e Neurologia Comportamental



RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: **Doroteia Moreira Lopes**

DN: 05/09/71

USO ORAL

1. Nabix 10.000mg/100mL ----- 01 frasco

Dose alvo: Tomar 0,5mL de 12 em 12 horas.

Dose inicial:

1ª semana: Tomar 0,1mL de 12 em 12 horas.

2ª semana: Tomar 0,3mL de 12 em 12 horas.

A partir da 3ª semana: Tomar 0,5mL de 12 em 12 horas.


OBS: Ajustar conforme orientação médica.

Justificativa:

. Portadora de epilepsia farmacorresistente, transtorno de ansiedade e insônia. Estava com controle satisfatório de sintomas e crises em uso de canabidiol. Suspendeu o uso por questões econômicas. Indico reinício de tratamento.

CID: G40 | F41.1

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2025



☎ 37 3521.3624 📞 37 99830.3332

✉ Agendamento@clinicatemplum.com.br | www.clinicatemplum.com.br

📍 R. Adriano Bento, 339 | B. Santa Lúcia | CEP: 35636-198 | Bom Despacho/MG