



PARA: PAULO HENRIQUE MINEIRO MOREIRA

UI - Uso Interno

USO SUBLINGUAL

NABIX 10.000MG .....01 FR

TOMAR 0,1ML APÓS O CAFÉ DA MANHÃ E 0,3ML APÓS O JANTAR

O AUMENTO DA DOSE TEM QUE SER GRADUAL A CADA 5 A 7 DIAS  
AUMENTAR 0,1ML POR VEZ, ATÉ MELHORA DOS SINTOMAS

DICAS GERAIS PARA MELHORAR A ABSORÇÃO:

- GUARDAR O FRASCO EM AMBIENTE FRESCO E PROTEGIDO DA LUZ
- AGITAR O FRASCO ANTES DE USAR
- FAZER O USO APÓS REFEIÇÃO
- DEIXAR PELO MENOS 1 MIN EM MUCOSA ORAL ANTES DE ENGOLIR
- NÃO BEBER ÁGUA E ESCOVAR OS DENTES PELO MENOS 15 MIN APÓS O USO DO CBD

27/10/2025

Dra. Nadia Elias Manfredinno  
CRM 14.994  
CPF: 831.330.892-34  
Rua Pereira Valente, 578 - Sala 1607  
Fone: (85) 98196-7080