

Paciente: Angelina D Eugenio ou Andrade
Endereço: R: Donolimonles, 665

Uso oral:

NABIX 1.500 – (1.500 mg CBD + 45 mg THC) frasco 30 ml –

Quantitativo: 3 frasco(s).

1ª semana: 0,2 ml após o almoço e 0,2 ml após o jantar

2ª semana: 0,4 ml após o almoço e 0,4 ml após o jantar

3ª semana: 0,6 ml após o almoço e 0,6 ml após o jantar

4ª semana: 0,8 ml após o almoço e 0,8 ml após o jantar

Ou

NABIX 10.000 – (10.000 mg CBD + 300 mg THC) frasco 100 ml -

Quantitativo: 3 frasco(s).

Iniciar a dosagem

1ª semana: 0,1 ml após o almoço e 0,1 ml após o jantar

2ª semana: 0,2 ml após o almoço e 0,2 ml após o jantar

3ª semana: 0,3 ml após o almoço e 0,3 ml após o jantar

4ª semana: 0,4 ml após o almoço e 0,4 ml após o jantar

Uso contínuo.

São José do Rio Preto, 12, Janeiro, 2026

Dr. Fabio Henrique Limonte
NEUROLOGISTA
CRM: 51.128 - RQE: 59036

Receituário conforme RDC nº 660 30 de março de 2022