

Dr. João Alves Cardoso Júnior

Neurologista | MSc - CRMMG 54.134 - RQE 49.660



Nome: Heitor Gomes Machado

CPF: 149.156.016-92

1. Nabix Day 6000mg/30mL - 200mg/mL 2 frascos

Dose alvo: Tomar 0,2mL de 12 em 12 horas.

Dose inicial:

1ª semana: Tomar 0,1mL de 12 em 12 horas, após as refeições.

A partir da segunda semana: Tomar 0,2mL de 12 em 12 horas, após as refeições.

Justificativa:

O paciente Heitor Gomes Machado, 10 anos, apresenta diagnóstico estabelecido de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Síndrome de Tourette, com início de tiques motores aos 4 anos de idade e posterior evolução para tiques vocais complexos, incluindo gritos que geram significativo prejuízo funcional, constrangimento social e ansiedade. Apesar do tratamento atual com Aripiprazol (Aristab[®]) e Metilfenidato (Atentah[®]), que resultou em melhora parcial da frequência e intensidade dos tiques, o paciente ainda apresenta sintomas residuais que se exacerbam em situações de estresse e ansiedade, interferindo em seu funcionamento social e acadêmico. Considerando a refratariedade parcial aos tratamentos convencionais, a literatura científica que demonstra eficácia dos fitocanabinoides no controle de tiques e sintomas neuropsiquiátricos associados, e o perfil de segurança favorável desta terapêutica em pacientes pediátricos, justifica-se a indicação de tratamento adjuvante com canabidiol (CBD) full spectrum como alternativa terapêutica para otimização do controle sintomático e melhora da qualidade de vida do paciente.

CID-11: 6A05.0 (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) | Síndrome de Tourette

Belo Horizonte, 07 de março de 2026



MEMED - Acesso à sua receita digital via QR Code
Endereço: Rua Adriano Bento, 339 - Santa Lúcia
Assinado digitalmente por **João A. Cardoso Jr. - CRM 54134 MG**
Token (Farmácia): **RCeehn** - Código de desbloqueio (Paciente): **0047**

Data e hora: 09/03/2026 - 14:13:35 (GMT-3)