

RECEITA MÉDICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome Completo: \_\_\_\_\_  
CRM \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Dr. Kellin Borges  
Neuropediatra  
CRM-MG 41899 / RQE 21756

Paciente: Hector Gomes Valadas  
Endereço: \_\_\_\_\_

Prescrição - Uso contínuo.

CANABIDIOL FARMAUSA 100/mL (3.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: \_\_\_\_\_  
Iniciar a dosagem com \_\_\_\_\_ mL e aumentar até a dose ideal.

Uso oral:

- Etapa 01 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

| Concentração mg/mL |        |
|--------------------|--------|
| 1,0 mL             | 100 mg |
| 0,9 mL             | 90 mg  |
| 0,8 mL             | 80 mg  |
| 0,7 mL             | 70 mg  |
| 0,6 mL             | 60 mg  |
| 0,5 mL             | 50 mg  |
| 0,4 mL             | 40 mg  |
| 0,3 mL             | 30 mg  |
| 0,2 mL             | 20 mg  |
| 0,1 mL             | 10 mg  |

OU

CANABIDIOL FARMAUSA 200/mL (6.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: 03 PR  
Iniciar a dosagem com — mL e aumentar até a dose ideal.

Uso oral:

- Etapa 01 – 0,2 mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

| Concentração mg/mL |        |
|--------------------|--------|
| 1,0 mL             | 200 mg |
| 0,9 mL             | 180 mg |
| 0,8 mL             | 160 mg |
| 0,7 mL             | 140 mg |
| 0,6 mL             | 120 mg |
| 0,5 mL             | 100 mg |
| 0,4 mL             | 80 mg  |
| 0,3 mL             | 60 mg  |
| 0,2 mL             | 40 mg  |
| 0,1 mL             | 20 mg  |

DATA 02, 03, 2026

Dr. Kellin Borges  
Neuropediatra  
CRM-MG 41899 / RQE 21756

Carimbo e assinatura