

**RECEITA MÉDICA**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome Completo: \_\_\_\_\_  
CRM \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

*Dr. Kellin Borges*  
Neurologista  
CRM-MG 11899 / RQE 21756

Paciente: Arthur C. Pudencis  
Endereço: \_\_\_\_\_


**Prescrição - Uso contínuo.**

**CANABIDIOL FARMAUSA 100/mL (3.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: \_\_\_\_\_**

Iniciar a dosagem com \_\_\_\_\_ ml e aumentar até a dose ideal.

**Uso oral:**

- Etapa 01 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia



Concentração mg/mL	
1,0 mL	100 mg
0,9 mL	90 mg
0,8 mL	80 mg
0,7 mL	70 mg
0,6 mL	60 mg
0,5 mL	50 mg
0,4 mL	40 mg
0,3 mL	30 mg
0,2 mL	20 mg
0,1 mL	10 mg


**OU**

**CANABIDIOL FARMAUSA 200/mL (6.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: 03 PR**

Iniciar a dosagem com \_\_\_\_\_ ml e aumentar até a dose ideal.

**Uso oral:**

- Etapa 01 – 0,5 mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia
- Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia



Concentração mg/mL	
1,0 mL	200 mg
0,9 mL	180 mg
0,8 mL	160 mg
0,7 mL	140 mg
0,6 mL	120 mg
0,5 mL	100 mg
0,4 mL	80 mg
0,3 mL	60 mg
0,2 mL	40 mg
0,1 mL	20 mg

DATA 12/01/2026

*Dr. Kellin Borges*  
Neurologista  
CRM-MG 11899 / RQE 21756

**Carimbo e assinatura**

Contato: Nayara Guimarães - 34-99124-7474  
Consultora Técnica FarmaUSA

