

# RECEITA MÉDICA

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CRM \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Paciente: Daniel Rodrigo Silva

Endereço: \_\_\_\_\_

### Prescrição - Uso contínuo.

CANABIDIOL FARMAUSA 100/mL (3.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: \_\_\_\_\_

Iniciar a dosagem com \_\_\_\_\_ ml e aumentar até a dose ideal.


#### Uso oral:

Etapa 01 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia



Concentração mg/mL	
1,0 mL	100 mg
0,9 mL	90 mg
0,8 mL	80 mg
0,7 mL	70 mg
0,6 mL	60 mg
0,5 mL	50 mg
0,4 mL	40 mg
0,3 mL	30 mg
0,2 mL	20 mg
0,1 mL	10 mg

OU

CANABIDIOL FARMAUSA 200/mL (6.000) – frasco 30 mL - Quant frascos: 02 Fr

Iniciar a dosagem com 0,25 ml e aumentar até a dose ideal.


#### Uso oral:

Etapa 01 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 02 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 03 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia

Etapa 04 – \_\_\_\_\_ mL – 2 vezes ao dia



Concentração mg/mL	
1,0 mL	200 mg
0,9 mL	180 mg
0,8 mL	160 mg
0,7 mL	140 mg
0,6 mL	120 mg
0,5 mL	100 mg
0,4 mL	80 mg
0,3 mL	60 mg
0,2 mL	40 mg
0,1 mL	20 mg

DATA 20,01,26

Daniel Rodrigo Silva  
Dr. Kellin Borges  
Neuropediatra  
CRM-MG 41859 / RQE 2175F

Carimbo e assinatura

Contato: Nayara Guimarães - 34-99124-7474  
Consultora Técnica FarmaUSA