

PACIENTE: IRACEMA DE OLIVEIRA GONÇALVEZ

DATA: 13/01/2026

I- USO ORAL/SUBLINGUAL:

1- FARMA USA – NABIX 1500 MG ----- 30 ML -----01 FRASCO

PRIMEIRA SEMANA: 02 GOTAS DE 12/12 HORAS

SEGUNDA SEMANA: 03 GOTAS DE 12/12 HORAS

TERCEIRA SEMANA: 04 GOTAS DE 12/12 HORAS

PINGAR SOB A LINGUA E DEIXAR POR 1 OU 2 MINUTOS ANTES DE ENGOLIR.


DEVE SER TOMADO APÓS UMA REFEIÇÃO E 1 HORA ANTES OU APÓS OUTROS MEDICAMENTOS.

AGITAR ANTES DE USAR.

DEIXAR LONGE DE CALOR, LUZ E UMIDADE

INDICAÇÃO : DOENÇA DE PARKINSON CID : 10 - G20

13/01/2026



Dr. Fernando de Oliveira
Neurologista
CRM 56243
ROE 61148

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME: _____

IDENTIDADE: _____ ÓRGÃO EXP. _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____

TEL: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASS. FARMACÊUTICO

DATA